

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Mobilat, Creme und Gel

Extrakt der Nebennierenrinde
Mucopolysaccharidpolysulfat
Salizylsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apotheker an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Mobilat und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Mobilat beachten?
3. Wie ist Mobilat anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Mobilat aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Mobilat und wofür wird es angewendet?

Mobilat Creme und Gel ist ein Arzneimittel gegen Schmerzen und Entzündungen der Muskeln und Gelenke.

Mobilat ist angezeigt bei der Symptomatischen Behandlung von:

- Unfall- und Sportverletzungen wie Verstauchungen, Quetschungen, Verrenkungen
- Erkrankungen der Sehnen, Bänder und Muskeln infolge von Verletzungen oder Entzündungen wie Sehnen-, Sehnenscheiden- und Schleimbeutelentzündungen, Tennisellenbogen, Muskelschmerzen und lokale Muskelverspannungen
- Erkrankungen im Bereich der Gelenke wie Steife und Schmerzen der Schulter, des Knies, der Finger und der Handgelenke
- als Zusatzbehandlung bei akuten und chronischen rheumatischen Erkrankungen

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Mobilat beachten?

Mobilat darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Salicylate, Extrakt der Nebennierenrinde, Mucopolysaccharidpolysulfat, Salizylsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- bei Windpocken
- bei Impfreaktionen

- im Falle von Akne, offenen Verletzungen, Geschwüren oder infizierten Wunden

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker, bevor Sie Mobilat anwenden.

- Nicht über einen längeren Zeitraum, auf großen Hautflächen oder unter einem dicht abschließenden Verband anwenden bei Säuglingen, Kleinkindern oder Patienten mit Nierenschäden.
- Mobilat Creme und Gel enthalten Alkohol. Der Kontakt mit den Schleimhäuten oder den Augen ist daher zu vermeiden.

Anwendung von Mobilat zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangere und stillende Frauen sollten die Anwendung von Mobilat auf großen Hautoberflächen oder über einen längeren Zeitraum vermeiden.

Mobilat Creme und Gel enthalten Alkohol

Vermeiden Sie deshalb den Kontakt mit Schleimhäuten und Augen.

Mobilat Creme enthält Cetostearylalkohol, Wollwachs und Thymol

Mobilat Creme enthält Cetostearylalkohol und Wollwachs. Können lokale Hautreaktionen hervorrufen (z. B. Kontaktdermatitis).

Mobilat Creme enthält Thymol als Konservierungsmittel.

Mobilat Gel enthält Propylenglykol und ätherische Öle

Mobilat Gel enthält Propylenglykol. Kann Hautreizungen hervorrufen.

Mobilat Gel enthält ätherische Öle (Rosmarinöl) als Parfüm.

3. Wie ist Mobilat anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Mehrmals täglich 5 bis 15 cm Salbe oder Gel auf die betroffenen Gebiete und ihre Umgebung auftragen. Das Gel gleichmäßig verteilen; die Salbe sanft einmassieren. Die Salbe kann unter einem Verband angewandt werden; in diesem Fall ist die Dosis zu erhöhen.

Wenn Sie eine größere Menge von Mobilat angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Mobilat angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

In seltenen Fällen kann eine Überempfindlichkeitsreaktion in Form einer Hautreizung oder Hautrötung auftreten. Die Behandlung sollte dann unterbrochen werden, wodurch die Erscheinungen im allgemeinen schnell verschwinden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Website: www.fagg-afmps.be anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Mobilat aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Zimmertemperatur lagern (15°C - 25°C).

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett oder dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Mobilat enthält

- Die Wirkstoffe sind: Extrakt der Nebennierenrinde 1,0 g (= 20 mg natürliche Corticosteroide) – Mucopolysaccharidpolysulfat 0,2 g – Salizylsäure 2,0 g
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Mobilat Creme: Glycerol (85%), Wollwachsalkoholsalbe, Cetostearylalkohol, Emulgator (Type A), Myristylalkohol, Stearinsäure, Olatin, Isopropylalkohol, Thymol, Dinatriumedetat, Geklärtes Wasser.
Mobilat Gel: Natriumedetat, Rosmarinöl, Propylenglykol, Cabomer, Olatin, Isopropylalkohol, Geklärtes Wasser.

Wie Mobilat aussieht und Inhalt der Packung

Salbe und Gel zur äußerlichen Kutane Anwendung.

Packungsgrößen: Tuben mit 50 g und 100 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Eurogenerics NV- Heizel Esplanade Heysel b22 - 1020 Brüssel

Hersteller

Daiichi Sankyo Europe GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen - Deutschland

Mobilat Produktions GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen - Deutschland

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Deutschland

Zulassungsnummern:

Mobilat Creme: BE047677

Mobilat Gel: BE105366

Abgabeform: freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt / überarbeitet im 11/2016 / 02/2015.