

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### Minoxidil Biorga 2 % Lösung zur Anwendung auf der Haut

#### Minoxidil

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Apothekers an>.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Minoxidil Biorga 2 % und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % beachten?
3. Wie ist Minoxidil Biorga 2 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minoxidil Biorga 2 % aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. WAS IST MINOXIDIL BIORGA 2 % UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

- Dieses Arzneimittel ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.
- Minoxidil Biorga 2 % wird angewendet zur lokalen Behandlung von anlagebedingtem Haarausfall (androgenetische Alopezie) bei Erwachsenen. Örtlich angewendet stimuliert Minoxidil Biorga 2 % bei manchen Personen den Haarwuchs und verhindert weiteren Haarverlust.
- Die Sicherheit und Wirksamkeit von Minoxidil Biorga 2 % bei Patienten unter 18 Jahren bzw. über 65 Jahren ist nicht erwiesen.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MINOXIDIL BIORGA 2 % BEACHTEN?

##### Minoxidil Biorga 2 % darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Minoxidil oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an einer Hauterkrankung leiden.
- auf infizierter Haut, auf durch Psoriasis angegriffenen Stellen, bei schwerem Sonnenbrand oder schweren Verletzungen.
- bei plötzlich oder unerwartet auftretendem Haarausfall, z. B. bei schwangeren Frauen oder Frauen, die kürzlich entbunden haben, oder bei Erkrankungen wie Schilddrüsenstörungen oder ungleichmäßigem Haarverlust durch eine Entzündung der Kopfhaut. Minoxidil Biorga 2 % ist auch nicht für Personen geeignet, die vollkommen kahl sind oder ihre gesamte Körperbehaarung verlieren.
- wenn Sie die Ursache Ihres Haarausfalls nicht genau kennen. In diesem Fall fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

## Packungsbeilage

- Vermeiden Sie es, Minoxidil Biorga 2 % mit den Augen und mit gereizter Haut in Kontakt zu bringen. Sollte es dennoch zu einem Kontakt gekommen sein, spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich kaltem Wasser. **Bei versehentlicher oraler Einnahme, fragen Sie bitte einen Arzt um Rat.** Vermeiden Sie das Einatmen des Sprühnebels. Die Lotion enthält Alkohol und ist somit entflammbar. Die Lotion ist AUSSCHLIESSLICH ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG BESTIMMT. MINOXIDIL BIORGA 2 % FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- Minoxidil Biorga 2 % kann Hautreizungen hervorrufen. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Erscheinung, hervorgerufen durch den Alkohol in Minoxidil Biorga 2 %. Wenn die Hautreizung anhält, sollten Sie jedoch die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt befragen. Bei folgenden Auswirkungen ist die Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % abzubrechen und ein Arzt zu befragen: Herzrasen oder Herzklopfen, unerklärliche rasche Gewichtszunahme, geschwollene oder aufgedunsene Hände, Knöchel oder Gesicht, Schwindelgefühl oder Bewusstlosigkeit, Trübsehen, Neuauftreten oder Verstärkung von Schmerzen in der Brust, den Armen oder Schultern, schwere Verdauungsstörungen, schwere Kopfhautreizung sowie anhaltende Rötung. Abgesehen von den harmlosen Hautreaktionen wurden keine ursächlichen Zusammenhänge mit Minoxidil Biorga 2 % festgestellt.
- Bei manchen Patienten wurden Veränderungen der Haarfarbe und/oder –beschaffenheit nach der Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % festgestellt.

*Wenn Sie noch andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % zusammen mit anderen Arzneimitteln“.*

*Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn einer der oben genannten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.*

### **Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die gleichzeitige Anwendung einer topischen Minoxidil-Lösung und einer Betamethasondipropionat-Creme (0,05 %) setzt die systemische Minoxidil-Absorption herab. Eine gesteigerte Minoxidil-Absorption wird beobachtet bei gleichzeitiger Verabreichung von Tretinoin (0,05 %) oder einer Anthralin-Creme. Wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder topisch anwenden, fragen Sie am besten Ihren Apotheker um Rat.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

#### Schwangerschaft

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht während der Schwangerschaft an.

#### Stillzeit

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht während der Stillzeit an.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Man erwartet kein Einfluss von die Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum bedienen von Maschinen.

### **Minoxidil Biorga 2 % enthält Alkohol und Propylenglykol**

Dieses Arzneimittel enthält Alkohol und Propylenglykol. Alkohol kann Hauttrockenheit hervorrufen. Propylenglykol kann allergische Hautreizungen hervorrufen.

## **3. WIE IST MINOXIDIL BIORGA 2 % ANZUWENDEN?**

## Packungsbeilage

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn sich Ihre Beschwerden nicht bessern, wenden Sie sich bitte erneut an Ihren Arzt oder Apotheker.

Tragen Sie zweimal täglich (in einem zeitlichen Abstand von 12 Stunden) eine Dosis von 1 mL auf der Kopfhaut auf, beginnend in der Mitte der zu behandelnden Stelle.

Die Gesamtdosis pro Tag darf 2 mL nicht überschreiten, unabhängig von der Oberfläche der zu behandelnden Stelle. Nicht öfter als zweimal täglich auftragen (Ihr Haar beginnt nicht schneller zu wachsen, wenn Sie eine größere Menge verwenden).

Verteilen Sie das Produkt mit den Fingerspitzen so, dass die gesamte zu behandelnde Fläche benetzt ist (siehe „Art der Anwendung“).

Vor und nach dem Auftragen der Lösung sorgfältig die Hände waschen.

Nur anwenden, wenn Haare und Kopfhaut vollkommen trocken sind. Nicht an anderen Körperstellen anwenden. Kontakt mit den Augen oder anderen empfindlichen Schleimhäuten vermeiden.

Verabreichung über die Haut. Äußerliche Anwendung.

### Art der Anwendung:

Die Verabreichungsmethode hängt vom verwendeten Applikator ab.

#### *Pumpspray:*

Dieser Applikator ist bei der Behandlung großer Flächen angezeigt.

1. Entfernen Sie den Deckel des Fläschchens.
2. Richten Sie die Spraypumpe auf die Mitte der zu behandelnden Fläche, pumpen Sie ein Mal und verteilen Sie das Produkt mit den Fingerspitzen, sodass die gesamte zu behandelnde Fläche benetzt ist. Wiederholen Sie dies 6 Mal, um eine Gesamtdosis von 1 mL zu verabreichen. Vermeiden Sie das Einatmen des Produkts.
3. Setzen Sie nach Gebrauch den Deckel wieder auf das Fläschchen.

#### *Mit einem Applikator versehenes Pumpspray:*

Dieser Applikator ist bei der Behandlung kleinerer Flächen oder unter den Haaren angezeigt.

1. Entfernen Sie den Deckel des Fläschchens.
2. Entfernen Sie den obersten Teil der Spraypumpe. Befestigen Sie den Applikator und drücken Sie ihn kräftig an.
3. Gehen Sie anschließend auf dieselbe Weise vor wie beim Pumpspray.

Auftragen einer 1-mL-Dosis, morgens und abends.

Die Dosierung und die Anwendungshäufigkeit dürfen nicht erhöht werden.



### Dauer der Anwendung:

Da das Haar nur langsam nachzuwachsen beginnt, wird es eine Weile dauern, bis die Wirkung von Minoxidil Biorga 2 % zu sehen ist. Im Normalfall muss Minoxidil Biorga 2 % ununterbrochen mindestens vier Monate lang zweimal pro Tag angewendet werden, bis Sie bemerken, dass Ihr Haar wieder zu wachsen beginnt. Nach drei Monaten kann sich Ihr Haarausfall stabilisieren. Um das bestmögliche Resultat zu erzielen, kann eine Behandlungsdauer zwischen acht Monaten (bei Frauen) und zwölf Monaten (bei Männern) erforderlich sein. Wenn Sie hinsichtlich Nachwachsen und

Packungsbeilage

Stabilisieren das bestmögliche Resultat erreichen möchten, müssen Sie Minoxidil Biorga 2 % täglich anwenden. Wenn Sie die Behandlung abbrechen, kann Ihr nachgewachsenes Haar innerhalb von drei bis vier Monaten wieder ausfallen, und Ihr Haarverlust schreitet voran.

**Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil Biorga 2 % angewendet haben, als Sie sollten**

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Minoxidil Biorga 2 % aus Versehen eingenommen haben. Die versehentliche Einnahme von Minoxidil Biorga 2 % kann folgende Störungen hervorrufen: Herzrasen oder Herzklopfen, geschwollene oder aufgedunsene Hände, Knöchel oder Gesicht, Schwindel oder Bewusstlosigkeit, Trübsehen, Schmerzen in der Brust oder Zeichen einer schweren Verdauungsstörung.

Minoxidil Biorga 2 % enthält Äthanol.

Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil Biorga 2 % eingenommen haben, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt, Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245.245).

**Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % vergessen haben**

Wenn Sie Minoxidil Biorga 2 % einmal vergessen haben, holen Sie die Anwendung bitte so rasch wie möglich nach, aber halten Sie sich dennoch an das normale Schema von zwei Dosen pro Tag.

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % abbrechen,**

Ihr nachgewachsenes Haar kann innerhalb von drei bis vier Monaten wieder ausfallen und Ihr Haarverlust kann voranschreiten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Setzen Sie sich sofort mit einem Arzt in Verbindung, wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen – möglicherweise benötigen Sie dringend medizinische Behandlung:

- Schwellungen des Gesichts, der Lippen oder des Rachens, die das Schlucken oder Atmen erschweren. Dies könnte ein Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion sein (Häufigkeit nicht bekannt, auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Erkrankungen des Immunsystems

Häufigkeit nicht bekannt: Auftreten allergischer Reaktionen, einschließlich Angioödem (Rhinitis, umschriebener oder verbreiteter Hautausschlag, allgemeine Rötung, geschwollenes Gesicht)

Erkrankungen des Nervensystems

Gelegentlich: Juckreiz, Kopfschmerzen, Nervenentzündung, Schwindelgefühl, Benommenheit, Gleichgewichtsstörungen und Übelkeit

Augenerkrankungen

Gelegentlich: Sehstörungen, Irritationen des Auges

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths

Gelegentlich: Ohrenentzündung

Herzkrankungen

In wenigen Einzelfällen kam es zu Blutdruckschwankungen, erhöhtem Puls, Herzklopfen und Schmerzen im Brustraum.

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Packungsbeilage

Gelegentlich: Kurzatmigkeit

### Leber- und Gallenerkrankungen

Es wurden wenige Einzelfälle von Leberfunktionsstörungen gemeldet.

### Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

- Aufgrund des enthaltenen Alkohols: Die regelmäßige Anwendung auf der Haut kann Irritationen hervorrufen und die Haut austrocknen lassen.
- Aufgrund des enthaltenen Propylenglykols: Risiko für Ekzeme (allergische Hautreaktion).
- Auftreten können: lokale Irritationen mit Desquamation (Abschuppung toter Hautzellen), Jucken, Hautrötungen, trockene Haut, Hypertrichose (abnormer Haarwuchs an von der behandelten Fläche entfernten Stellen), Brennen, lokaler Hautausschlag, Hautentzündungen und Nesselsucht.
- Es kann zu verstärktem Haarausfall durch Minoxidil kommen, das Haare in der Telogenphase ersetzt durch Haare in der Anagenphase (alte Haare fallen aus und werden durch neue ersetzt). Dieser vorübergehend verstärkte Ausfall tritt im Allgemeinen 2 bis 6 Wochen nach Behandlungsbeginn auf und normalisiert sich nach einigen Wochen wieder (dies ist ein erstes Zeichen für die Wirksamkeit von Minoxidil).
- Zu den seltenen Nebenwirkungen zählen ferner eine allergische Kontaktdermatitis, eine Entzündung der Haarfollikel, Haarverlust und übermäßige Talgabsonderung.

### Allgemeine Erkrankungen

Gelegentlich: Schwäche, Geschmacksveränderungen, Schwellungen, Störungen der Sexualfunktion. In seltene Fällen kam es zu unerwünschtem Haarwuchs abseits der Kopfhaut, z. B. Gesichtshaarwachstum bei Frauen.

In all diesen Fällen muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt um Rat gefragt werden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brüssel - Website: [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be) - E-Mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden

## **5. WIE IST MINOXIDIL BIORGA 2 % AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Vor Licht geschützt aufbewahren.  
Brennbares Produkt.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett oder dem Umkarton nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Minoxidil Biorga 2 % enthält**

- Der Wirkstoff ist Minoxidil 20 mg/mL.

Packungsbeilage

- Die sonstigen Bestandteile sind: 96 % Äthanol, Propylenglykol, gereinigtes Wasser.

#### **A. Was bezeichnet man als androgenetische Alopezie?**

Im Normalfall haben Haare eine Lebensdauer von 3 bis 6 Jahren, und pro Tag fallen zwischen 50 und 100 Haaren aus.

Zu verstärktem Haarausfall kann es jahreszeitenabhängig (im Herbst) oder nach einer Entbindung kommen: Dieser Haarausfall ist normal und nur vorübergehend, und es besteht kein Grund, mit einer Behandlung zu beginnen. Von einer Alopezie spricht man bei einem Haarverlust von mehr als 100 Haaren pro Tag.

Man unterscheidet 2 Arten der Alopezie:

- die akute Alopezie
  - die chronische Alopezie
- Die akute Alopezie (plötzlicher Haarausfall über einen kurzen Zeitraum) kann diffus auftreten oder stellenweise (kahle Flecken auf dem Kopf), und die Ursache ist meistens bekannt (aggressive Haarbehandlung, schlechter Allgemeinzustand, unausgewogene Abmagerungskur, bestimmte Medikamente, psychischer Schock, Stress ...).  
Diese akute Alopezie braucht nicht mit diesem Arzneimittel behandelt zu werden.
- Die chronische Alopezie (über einen längeren Zeitraum) ist beinahe immer diffus.  
Zum Teil ist sie auf eine spezielle Erkrankung zurückzuführen (z. B. Schilddrüse, metabolisch) und braucht nicht mit diesem Arzneimittel behandelt zu werden.  
In den meisten Fällen kann die Ursache dieser chronischen Alopezie nicht sicher ermittelt werden, meistens ist sie genetisch bedingt: Hier spricht man von androgenetische Alopezie.  
Nur diese Art der Kahlköpfigkeit kann mit Minoxidil behandelt werden.

#### **B. Wie kann man eine androgenetische Alopezie erkennen?**

- Bei Frauen ist die androgenetische Alopezie von diffuser Art. Es kommt zu einer allgemeinen Verringerung der Haardichte. Beginnend am Scheitel wird der Haarwuchs zunehmend schütterer.
- Bei Männern beginnt die androgenetische Alopezie mit der Entstehung von Geheimratsecken. Danach kommt es zu einer leichten Glatzenbildung des Haarwurzels. Diese beiden kahlen Stellen werden allmählich größer: Die androgenetische Alopezie entwickelt sich immer weiter fort in Richtung Kahlheit.

#### **C. Tipps zur Anwendung**

- Verwenden Sie ein mildes Shampoo (vorzugsweise ohne Silikon).  
Wenn Sie nach der Anwendung von Minoxidil die Haare mit Shampoo waschen möchten, warten Sie nach der Anwendung bitte erst 4 Stunden ab.  
Wenn Sie nach dem Haarewaschen mit Shampoo Minoxidil anwenden, sollte dies auf trockener Kopfhaut erfolgen. Sie können nach der Anwendung von Minoxidil Ihre Haare föhnen, am besten jedoch nur mit schwacher Hitze.
- Sie dürfen Haarschaum, -gel oder -spray benutzen, wenn Sie zwischen den Anwendungen mindestens eine Stunde warten.
- Ihre Behandlung mit Minoxidil und Ihre Dauerwelle oder Haarcoloration beeinträchtigen sich nicht gegenseitig, aber da diese Behandlungen das Haar stark angreifen, ist es ratsam, sie möglichst einzuschränken. Um eine Reizung Ihrer Kopfhaut zu verhindern, müssen Sie Minoxidil Biorga 2 % erst komplett aus dem Haar heraus- und von der Kopfhaut abwaschen, bevor Sie solche chemischen Produkte verwenden.
- Wenn Sie sich nach der Anwendung von Minoxidil Biorga 2 % der Sonne aussetzen möchten, sollten Sie eine Kopfbedeckung tragen.

#### **D. Zusätzliche Informationen**

## Packungsbeilage

- Zu Beginn der Behandlung kann es für kurze Zeit zu verstärktem Haarausfall kommen. Diese Haare wären ohnehin in Kürze ausgefallen, und dies geschieht nun früher. Das ist ein normaler Vorgang, und Sie können die Behandlung fortsetzen.
- Die ersten Haare, die nachwachsen, werden weich, flaumig und kaum zu sehen sein. Im Laufe der Behandlungsdauer werden sie sich verändern und dicker werden.
- Wenn Sie gut auf die Behandlung ansprechen, können Sie selbst bestimmen, wie lange Sie Minoxidil Biorga 2 % anwenden. Mit anderen Worten: Sie dürfen Minoxidil Biorga 2 % so lange anwenden, wie Sie es für nötig halten. Wenn Sie sich später dazu entscheiden, der Natur freien Lauf zu lassen, können Sie die Behandlung einfach beenden. Ihr Haar wird automatisch in den Zustand vor Behandlungsbeginn zurückkehren, aber dann zum Beispiel zehn Jahre später als normal. Wenn nach einem Jahr keine Verbesserung zu erkennen ist, muss die Anwendung beendet werden.

### **Wie Minoxidil Biorga 2 % aussieht und Inhalt der Packung**

Die Farbe von Minoxidil Biorga 2 % kann zwischen hell, farblos und gelblich variieren. Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

60-mL-Flasche mit Dosierpumpe.

Packung mit 1 x 60 mL und 3 x 60 mL.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Laboratoires Bailleul S.A.

10-12, Avenue Pasteur

L-2310 Luxemburg

Luxemburg

#### Hersteller

Delpharm Huningue SAS

26 Rue de la Chapelle

68330 Huningue

Frankreich

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung:

Laboratoires Bailleul sprl

Route de Lennik 451

B-1070 Anderlecht

Tel : 02/502.04.10

### **Art der Abgabe**

Apothekenpflichtig

### **Zulassungsnummer**

BE365504

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 04/2019.**

**Datum der Zulassung : 05/2019**