

Cedium Benzalkonium, 1 mg/ml, Lösung zur Anwendung auf der Haut
Cedium Benzalkonium, 1 mg/ml, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung
Benzalkoniumchlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Cedium Benzalkonium und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cedium Benzalkonium beachten?
3. Wie ist Cedium Benzalkonium anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cedium Benzalkonium aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST CEDIUM BENZALKONIUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Cedium Benzalkonium ist eine Desinfektionslösung für die lokale Anwendung auf der Haut (äußerliche Anwendung). Cedium Benzalkonium wird verwendet, um kleine Verletzungen, oberflächliche Wunden, Schnitt- und Schürfwunden, Brandwunden und Insektenstiche zu desinfizieren und um die Haut zu reinigen vor dem Anbringen eines Pflasters, um Entzündungen vorzubeugen.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CEDIUM BENZALKONIUM BEACHTEN?

Cedium Benzalkonium darf nicht angewendet werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Benzalkoniumchlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Cedium Benzalkonium sind.
- Bei bestehenden allergischen Erkrankungen: Hautausschlag, Hautflecken und Reizungen.
- Zusammen mit Seife oder hartem Wasser (kalkhaltiges Wasser).
- Auf der Schleimhaut (vor allem den Augen).
- Zusammen mit einem abschließenden Verband.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cedium benzalkonium anwenden.

- Sie dürfen dieses Produkt nicht hinunterschlucken.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht langfristig oder wiederholt anwenden.
- Bei einer Hautverletzung, die mit Fieber einhergehen, ist eine allgemeine Behandlung gegen Infektionen erforderlich.
- Blut und Eiter können die Wirksamkeit dieses Produkts beeinträchtigen.
- Wenn Sie weitere Medikamente anwenden, lesen Sie den Abschnitt „Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Das Medikament dient der lokalen äußerlichen Anwendung. Unter Berücksichtigung der vorhergenannten Vorsichtsmaßnahmen kann das Produkt während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Es wird jedoch empfohlen, den behandelnden Arzt davon in Kenntnis zu setzen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

3. WIE IST CEDIUM BENZALKONIUM ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Flasche mit Sprühpumpe: die Lösung 2 bis 3 Mal am Tag auf die Wunde aufsprühen.

Ohne zu reiben trocknen lassen.

Tropfbehältnis: einige Tropfen 2 bis 3 Mal am Tag direkt auf die Wunde oder auf eine sterile Kompresse aufträufeln.

Ohne zu reiben trocknen lassen.

Wenn Sie die Haut zuerst mit Wasser und Seife waschen müssen, achten Sie darauf, alle Seifenreste sorgfältig zu beseitigen. Die Anwendung muss nach jeder Wäsche wiederholt werden. Das Produkt hinterlässt keine Flecken.

Behandlungsdauer möglichst kurz halten. Wenn keine Besserung nach 3 Tagen eintritt, besuchen Sie am besten einen Arzt. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie Cedium Benzalkonium anwenden müssen.

Wenn Sie eine größere Menge von Cedium Benzalkonium angewendet haben, als Sie sollten

Bei lokaler äußerer Anwendung in der angegebenen Menge gibt es keine Gefahr einer Überdosierung. Gemeint ist dabei die zufällige Einnahme durch Unvorsichtigkeit oder Unachtsamkeit großer Mengen der Lösung.

Wenn Sie eine größere Menge von Cedium Benzalkonium haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Folgende Symptome können auftreten: Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden.

Behandlung: die Person Milch trinken lassen. Aufnahme ins Krankenhaus kann notwendig sein.

Wenn Sie die Anwendung von Cedium Benzalkonium vergessen haben

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Wenn Sie die Anwendung von Cedium Benzalkonium abbrechen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch Cedium Benzalkonium Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Bei Kontakt mit der Schleimhaut (Augen) sind Irritationen oder Brennen möglich.
- Bei häufigem oder langem Gebrauch kann es zu einer progressiven Sensibilisierung der Haut kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über:

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 BRUSSEL

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg/Luxemburg

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST CEDIUM BENZALKONIUM AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten beiden Ziffern geben den Monat, die folgenden zwei oder vier Ziffern das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN.

Was Cedium Benzalkonium enthält

- Der Wirkstoff ist Benzalkoniumchlorid 1 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind Natriumedetat - Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat -Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat – Natriumchlorid - Gereinigtes Wasser.

Wie Cedium Benzalkonium aussieht und Inhalt der Packung

Cedium benzalkonium wird angeboten in Form eines Tropfbehältnis mit 30 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut und eines Flasche (HDPE) mit 50 ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung mit Sprühpumpe (LDPE und PP).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – 2880 Bornem – Belgien

Zulassungsnummer:

Tropfbehältnis: BE 009965

Flasche mit Sprühpumpe: BE 192832

Art der Abgabe: Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 02/2014.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 04/2014.