

Packungsbeilage VERMOX**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss VERMOX jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- *Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.*
- *Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.*
- *Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.*

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist VERMOX und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von VERMOX beachten?
3. Wie ist VERMOX einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist VERMOX aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Bezeichnung des Arzneimittels**VERMOX 100 mg Tabletten****VERMOX 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen**

Der Wirkstoff ist Mebendazol.

VERMOX Tabletten enthalten 100 mg Mebendazol (R 17 635) pro Tablette.

Sonstige Bestandteile: mikrokristalline Zellulose, Talkum, Maisstärke, Carboxymethylstärke-Natrium, Natriumsaccharin, Magnesiumstearat, hydrogeniertes Baumwollsaatöl, Orangenschalenöl, Siliziumdioxid, Natriumlaurylsulfat, Gelborange S (E110).

VERMOX Suspension zum Einnehmen enthält 20 mg Mebendazol (R 17 635) pro ml Suspension.

Sonstige Bestandteile: mikrokristalline Zellulose, Methylzellulose, Natriumcarboxymethylzellulose, Saccharose, Natriumlaurylsulfat, Methylparahydroxybenzoat, Propylparahydroxybenzoat, Bananenaroma, Zitronensäure, gereinigtes Wasser.

Zulassungsinhaber

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

2340 Beerse, Belgien

HerstellerTabletten

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

04100 Borgo San Michele

Latina, Italië

oder

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

2340 Beerse, België

oder

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA

Estrada Consiglieri Pedroso 69-B Queluz

2730-055 Barcarena, Portugal

Suspension zum Einnehmen

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, België
oder
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, België

Zulassungsnummer

VERMOX Tabletten: BE001057
VERMOX Suspension zum Einnehmen: BE101324

1. WAS IST VERMOX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**Tabletten** zur oralen Einnahme:

Die Tabletten sind in einer Durchdrückpackung mit 6 oder 10 Tabletten erhältlich.

Suspension zum Einnehmen:

Die Suspension zum Einnehmen ist in einer Flasche mit 30 ml Trinklösung (mit Dosierkappe aus Kunststoff für 5 ml) erhältlich.

VERMOX ist ein Mittel gegen Wurminfektionen.

VERMOX ist zur Behandlung von Infektionen durch eine oder mehrere Wurmarten angezeigt:

- Madenwurm (*Enterobius vermicularis*);
- Spulwurm (*Ascaris lumbricoides*);
- Peitschenwurm (*Trichuris trichuria*);
- Hakenwurm (Grubenwurm) (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Bandwurm (*Taenia* spp.);
- Zwergfadenwurm (*Strongyloides stercoralis*).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VERMOX BEACHTEN?**VERMOX darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mebendazol oder einen der sonstigen Bestandteile von Vermox sind. Diese Überempfindlichkeit kann durch Hautausschlag, Jucken, Kurzatmigkeit und/oder ein geschwollenes Gesicht zum Ausdruck kommen. Brechen Sie in diesem Fall die Behandlung ab und suchen Ihren Arzt auf.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von VERMOX ist erforderlich,

- wenn es Kindern unter 2 Jahren verabreicht wird. Vermox darf Kleinkindern unter 2 Jahren nur dann verabreicht werden, wenn die Wurminfektion den Ernährungszustand und die körperliche Entwicklung des Kindes deutlich beeinträchtigt. Fragen Sie in jedem Fall zuerst Ihren Arzt um Rat.
- wenn Sie noch andere Arzneimittel einnehmen. Lesen Sie bitte auch den Abschnitt "Einnahme von Vermox zusammen mit anderen Arzneimitteln".

Bei Einnahme von VERMOX zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft

Vor allem in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ist es erforderlich, die Vorteile von VERMOX gegenüber den möglichen Risiken abzuwägen.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Stillzeit

Während der Stillzeit müssen Sie mit der Einnahme von VERMOX vorsichtig sein. Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

VERMOX hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von VERMOX

Nicht zutreffend.

Einnahme von VERMOX zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

- Wenn Sie gleichzeitig Cimetidin (ein Arzneimittel gegen Magensäure) einnehmen, müssen Sie dies Ihrem Arzt mitteilen. Er wird die angemessenen Maßnahmen treffen und die notwendigen Dosisanpassungen vornehmen.
- Die gleichzeitige Einnahme von Vermox und Metronidazol (ein Arzneimittel gegen Bakterien- und Protozoeninfektionen) ist zu vermeiden.

3. WIE IST VERMOX EINZUNEHMEN?

Befolgen Sie diese Anweisungen bitte genau, es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen etwas anderes verordnet. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie viel VERMOX Sie einnehmen müssen, hängt von der Wurmart ab, mit der Sie infiziert sind. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

1. Madenwürmer (Enterobius vermicularis):

1 einzige Tablette oder 5 ml (= 1 Dosierkappe) Trinklösung.

Alle Familienmitglieder müssen gleichzeitig behandelt werden und diese Behandlung muss nach 2 bis 4 Wochen wiederholt werden (alle Familienmitglieder nehmen erneut 1 Tablette oder 5 ml Trinklösung ein). Dies ist für eine wirksame Behandlung notwendig: die erste Einnahme tötet alle Würmer ab, jedoch nicht deren Eier, die eine neuerliche Infektion verursachen können.

Die Dosierung gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

2. Spulwürmer, Peitschenwürmer, Hakenwürmer und Mischinfektionen:

1 Tablette oder 5 ml (= 1 Dosierkappe) Trinklösung morgens und abends an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Dosierung gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

3. Bandwürmer und Zwergfadenwürmer:

* *Erwachsene:*

2 bis 3 Tabletten oder 10 bis 15 ml (= 2 bis 3 Dosierkappen) Trinklösung morgens und abends an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

* *Kinder über 2 Jahre:*


1 Tablette oder 5 ml (= 1 Dosierkappe) Trinklösung morgens und abends an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Kinder unter 2 Jahre: siehe Abschnitt "Besondere Vorsicht bei der Einnahme von VERMOX ist erforderlich".

Wenn Sie eine Behandlung mit VERMOX durchführen, dürfen Sie keine spezielle Diät befolgen und keine Abführmittel einnehmen.

Die Tablette(n) mit etwas Wasser einnehmen. Die Suspension vor Gebrauch schütteln.

Die Flasche wird wie folgt geöffnet: die Schraubkappe aus Kunststoff nach unten drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).

**Wenn Sie die Einnahme von VERMOX vergessen haben**

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Einnahme von VERMOX abgebrochen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie eine größere Menge von VERMOX eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zuviel VERMOX eingenommen haben, nehmen Sie bitte unverzüglich mit Ihrem Arzt, Apotheker oder mit der Vergiftungszentrale (070/245.245) Kontakt auf.

Die Einnahme einer zu großen Menge VERMOX birgt keine großen Gefahren. Im schlimmsten Fall können Darmkrämpfe, Erbrechen und Durchfall oder Kopfschmerzen und Schwindel auftreten. Bei lang andauernder Einnahme großer Mengen kann es zu einer Störung der Lebefunktion kommen.

Wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt, müssen Sie Ihren Arzt davon unterrichten. Die Verabreichung von Aktivkohle kann von Nutzen sein.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann VERMOX Nebenwirkungen haben.

VERMOX ist gut verträglich und bei Einnahme der vorgeschriebenen Mengen sind kaum Nebenwirkungen zu erwarten. Die folgenden Nebenwirkungen können jedoch gelegentlich auftreten:

- Kurz andauernde Magenschmerzen und Durchfall können gelegentlich vorkommen, vor allem wenn Sie eine schwere Wurminfektion haben. In diesem Fall können Sie Vermox entsprechend den Anweisungen weiter einnehmen.
- Überempfindlichkeit gegenüber Vermox kommt sehr selten vor. Diese kann zum Beispiel durch Hautausschlag, Jucken, Kurzatmigkeit und ein geschwollenes Gesicht zum Ausdruck kommen. Wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt, brechen Sie die Einnahme von Vermox ab und setzen sich mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- In sehr seltenen Fällen wurde eine ernste Hauterkrankung mit Hautausschlag, Blasen auf der Haut und Geschwüren im Mund, an den Augen sowie im Genital- und Afterbereich zusammen mit Fieber mitgeteilt. Wenn Sie diese Symptome bemerken, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
- Sehr selten können Konvulsionen (Krämpfe) bei Säuglingen auftreten. Vermox darf Kindern unter 1 Jahr nur verabreicht werden, wenn Ihr Arzt es verschrieben hat.
- Sehr selten können bei lang andauernder Einnahme von Vermox in Dosen, die deutlich über den empfohlenen Dosen liegen (d.h. viel höher, als die normalerweise verordneten), Probleme in Bezug auf Blut, Leber und Nieren auftreten.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind und die Sie als schwerwiegend empfinden.

5. WIE IST VERMOX AUFZUBEWAHREN

VERMOX wird bei Zimmertemperatur (15-30°C) und vor Licht geschützt aufbewahrt.

VERMOX für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verfalldatum

Die Abkürzung "EXP" auf der Verpackung bedeutet, dass das Arzneimittel am letzten Tag des Monats verfällt, der nach der Abkürzung angegeben ist (Monat und Jahr).

6. WEITERE INFORMATIONEN

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Abgabe

VERMOX Tabletten und Suspension zum Einnehmen sind rezeptfrei erhältlich.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im überarbeitet 04/2016.

Diese Gebrauchsgenehmigung wurde zuletzt genehmigt im 05/2016