

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

Inotyol, Salbe  
Ichtammol – Zinkoxid - Titandioxid

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Inotyol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Inotyol beachten?
3. Wie ist Inotyol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Inotyol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## **1. WAS IST INOTYOL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Inotyol ist ein Arzneimittel zum Auftragen auf die Haut mit heilungsfördernder desinfizierender Wirkung. Inotyol wird benutzt für Rötungen im Gesässbereich, Frostbeulen, Schrunden, Ekzeme, oberflächliche Wunden und kleine Verbrennungen.

## **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON INOTYOL BEACHTEN?**

### **Inotyol darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- bei nässenden und superinfizierten Wunden.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Nicht in die Augen oder auf die Schleimhäute bringen.

### **Anwendung von Inotyol zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

### **Anwendung von Inotyol zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Nicht zutreffend.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Inotyol ist in Schwangerschaft und Stillzeit nicht kontraindiziert. Dennoch sollte bei der Behandlung rissiger Haut im Bereich der Brust ober Brustware die Haut vor dem Stillen gründlich gereinigt werden, um einer unbeabsichtigten Aufnahme durch den Säugling vorzubeugen.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Nicht zutreffend.

## **Inotyol enthält Lanolin**

Lanolin (Wollfett) kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

### **3. WIE IST INOTYOL ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

*Rötungen im Gesässbereich:* nach jeder Wäsche soll die Haut sorgfältig abgetrocknet werden. Danach Inotyol auf die entzündete Hautfläche dick auftragen.

*Weitere Indikationen:* Inotyol 2 - 3 mal täglich auf die geschädigte Haut auftragen.

Im Falle superinfizierter Wunden darf die Salbe erst nach vorheriger Desinfektion angewendet werden. Gegebenenfalls mit einer Mullkompressen abdecken.

Ihr Arzt oder Apotheker wird Ihnen sagen, wie lange Sie Inotyol benutzen müssen. Stellen Sie Ihre Behandlung nicht vorzeitig ab.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Inotyol angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Inotyol angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

#### **Wenn Sie die Anwendung von Inotyol vergessen haben**

Nicht zutreffend.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Inotyol abbrechen**

Wenn am Ende der Behandlung die Symptome anhalten, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wie bei jeder Substanz, die auf die Haut aufgetragen wird, ist eine allergische Reaktion auf jeden der Bestandteile von Inotyol, insbesondere auf Wollwachs, möglich.

Aufgrund der Anwesenheit, als Hilfsstoffe für Terpenderivate und **im Falle der Nichteinhaltung der empfohlenen Dosen:**

- Risiko von Krämpfen bei Kindern und Säuglingen,
- Unruhe, Verwirrtheit möglich bei älteren Menschen

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

#### *Belgien*

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz; Website: [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be); E-Mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be).

#### *Luxemburg*

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST INOTYOL AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Zimmertemperatur (15°C - 25°C) aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Inotylol enthält**

- Die Wirkstoffe sind: Ichtammol 1,50 g, Zinkoxid 15,00 g, Titandioxid 5,00 g pro 100,00 g Salbe
- Die sonstigen Bestandteile sind: Wollwachs, flüssiges Paraffin, Vaseline, Aetheroleum lavandulae, gereinigtes Wasser. Für Wollwachs (Lanolin): siehe Abschnitt 2 für weitere Informationen.

### **Wie Inotylol aussieht und Inhalt der Packung**

Salbe, Aluminium Tube mit 50 g und 90 g.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer*

URGO S.A.

Chaussée de Ruisbroek 76

B-1180 Brüssel

#### *Hersteller*

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

2 avenue de Strasbourg

F-21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Frankreich

**Zulassungsnummer:** BE 187467

**Abgabeform:** Freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 12/2015.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 01/2016.