

GEBRAUCHSINFORMATION DOGMINTH

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber, der Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

DOGMINTH

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Pyranteli embonas (= pyrantelum 7,5 mg) - Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisabile - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Dogminth dient der Behandlung von Verwürmungen im Magen-Darm-Trakt des Hundes, die von Nematoden wie *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* und *Uncinaria stenocephala* hervorgerufen werden.

5. GEGENANZEIGEN

Es sind keinerlei Gegenanzeigen bekannt.

6. NEBENWIRKUNGEN

Es wurden keinerlei Nebenwirkungen beobachtet.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunden.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dogminth wird einmalig oral verabreicht.

Die Dosis beträgt 5 mg Pyrantelbase je kg Lebendgewicht.

Behandlungsschema :

Es wird angeraten,

- die Welpen: ab dem Alter von 2 bis 4 Wochen sowie im Alter von 7–8 und 12 Wochen.
- die Hündinnen: unmittelbar vor oder nach dem Decken und unmittelbar vor dem Werfen.
- die anderen Hunde: mindestens einmal im Jahr zu entwurmen.

Das hier empfohlene Behandlungsschema ist eine Beispiel-Dosierung.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Dogminth Spritzen mit 16 g:

Die Menge der zu verabreichenden Paste muss entsprechend der auf der Spritze aufgedruckten Gewichtsskala an das Gewicht des Tieres angepasst werden.

Dogminth Tube 24 g:

Bei einfacher Druckausübung auf die Tube quillt die Paste in einem Strang heraus; je kg Lebendgewicht sind 2 cm Paste (entspricht einer Dosis von 5 mg Pyrantelbase je kg Lebendgewicht) zu verwenden. Die Menge der zu verabreichenden Paste wird mit Hilfe der auf der Schachtel aufgedruckten Skala bestimmt.

Die für eine Behandlung benötigte Pastenmenge kann direkt auf die Zunge des Tieres gegeben oder unter die Nahrung gemischt werden.

Spezielle Vorkehrungen bezüglich Futtermittel sind im Vorfeld nicht erforderlich.

Dogminth kann gefahrlos für Hunde aller Altersklassen eingesetzt werden und wird von den Welpen gut vertragen, auch bei wiederholter Anwendung.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Der Spritzen vor Licht schützen.

Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 3 Jahre

12. BESONDERE WARNHINWEISE

- Die das Arzneimittel verabreichenden Personen brauchen keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Die Verabreichung von Dogminth an trächtige oder säugende Hündinnen ist ohne Bedenken möglich.
- Zusätzlich zu den unter Punkt 4 beschriebenen Indikationen - wo jedoch die Parasiten nicht endemisch in Belgien und Luxemburg sind - sollte beachtet werden, dass Dogminth ebenfalls zur Behandlung gastro-intestinaler Krankheiten, verursacht durch *Ancylostoma caninum* und *Ancylostoma braziliense*, angezeigt ist.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Es sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Mai 2014.

15. WEITERE ANGABEN

BE-V164096 (Spritze von 16 g)

BE-V105506 (Tube von 24 g)

Nicht verschreibungspflichtig