

Packungsbeilage

PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für Anwender

OSCILLOCOCCINUM®, Globuli
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von OSCILLOCOCCINUM, Globuli beachten?
3. Wie ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli und wofür wird es angewendet?

OSCILLOCOCCINUM ist ein traditionelles homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung von grippalen Zuständen : Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen.

OSCILLOCOCCINUM verkürzt die Dauer von Grippe-symptomen. Während der Grippezeit kann eine einmalige Einnahme pro Woche die Intensität der Symptome verringern.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von OSCILLOCOCCINUM, Globuli beachten?

OSCILLOCOCCINUM darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von OSCILLOCOCCINUM sind.

Einnahme von OSCILLOCOCCINUM zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme eines Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

OSCILLOCOCCINUM hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

OSCILLOCOCCINUM enthält Lactose und Saccharose

Bitte nehmen Sie erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden

Packungsbeilage

3. Wie ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli einzunehmen?

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach den Anweisungen dieser Packungsbeilage oder genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Kinder:

Die Dosierung hängt vom Zeitpunkt der Anwendung ab:

- *zur Vorbeugung während der Grippezeit:* 1 Dosis pro Woche.
- *bei beginnendem grippalem Zustand:* 1 Dosis so früh wie möglich, danach eventuell in Abständen von sechs Stunden 2- bis 3mal wiederholen.
- *bei ausgebrochenem grippalem Zustand:* morgens und abends 1 Dosis über 1 bis 3 Tage.

Arzneimittel mindestens 15 Minuten vor oder 1 Stunde nach den Mahlzeiten einnehmen.

Alle in einer Dosis enthaltenen Globuli im Mund zergehen lassen.

Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr alt

Globuli erst in Wasser auflösen.

Wenn Sie eine größere Menge von OSCILLOCOCCINUM eingenommen haben, als Sie sollten

Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (Tel. 070/245.245), wenn Sie eine größere Menge von OSCILLOCOCCINUM angewendet haben, als Sie sollten.

Wenn Sie die Einnahme von OSCILLOCOCCINUM vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Keine Nebenwirkungen bis Heute berichtet.

Wie alle Arzneimittel kann OSCILLOCOCCINUM Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brüssel

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist OSCILLOCOCCINUM, Globuli aufzubewahren?

Packungsbeilage

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Außer Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen OSCILLOCOCCINUM, Globuli nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum verweist am letzten Tag des Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was OSCILLOCOCCINUM enthält

- **der Wirkstoff ist:**
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 0,01 ml
pro Dosis à 1g.
- **die sonstigen Bestandteile sind** Saccharose und Lactose.

Wie OSCILLOCOCCINUM aussieht und Inhalt der Packung

Globulidosis in Polypropylenröhrchen mit Polyethylenkapsel.

Packung mit 3, 6 oder 30 Dosen à 1 g. **Alle Darreichungsformen können nicht kaufbar sein.**

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
F-69510 Messimy
Frankreich

Hersteller:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
F-69510 Messimy
Frankreich

BOIRON
20 rue de la Libération
F-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Frankreich

Zulassungsnummer

HO-BE457120

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt am 16/04/2014