

GEBRAUCHSINFORMATION

Panacur Tabletten 250 mg

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH ISTZulassungsinhaber:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Niederland vertreten durch MSD Animal Health GmbH – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brüssel

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Intervet GesmbH, Siemensstraße 105, A-1210 Wien, Österreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Panacur Tabletten 250 mg

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält 250 mg Fenbendazol.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Hunden und Katzen infiziert mit adulten sowie nicht adulten Stadien von Magen-Darm-Spulwürmern, Hakenwürmern, Peitschenwürmern und Bandwürmern.

Zur Prävention und Kontrolle von Giardia Infektionen bei Hunden.

Beim Hund: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Giardia*.

Bei der Katze: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforma*, *Taenia taeniaformis*, *Ollulanus*, *Aelurostrongylus*.

5. GEGENANZEIGEN

Keine.

6. NEBENWIRKUNGEN

In sehr seltenen Fällen können Erbrechen und milde Diarrhö beobachtet werden bei Katzen.

In seltenen Fällen können Magen-Darmerkrankungen (wie Erbrechen und milde Diarrhö) beobachtet werden bei Hunden.

In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen beobachtet werden bei Hunden.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur Behandlung von klinische Wurminfektionen bei erwachsenen Hunden und Katzen oder abgestillten Hunde-Welpen und Kätzchen junger als 6 Monate und für die Prävention und Kontrolle

von Giardia Infektionen bei Hunden beträgt die Dosis 50 mg pro kg Körpergewicht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.

<i>Körpergewicht</i>	<i>Dosierung</i>
2,5 kg	½ Tablette pro Tag während 3 Tagen
5 kg	1 Tablette pro Tag während 3 Tagen
7,5 kg	1 ½ Tabletten pro Tag während 3 Tagen
10 kg	2 Tabletten pro Tag während 3 Tagen

Zur Routinebehandlung von erwachsenen Hunden beträgt die Basisdosierung einmalig 100 mg Fenbendazol.

<i>Körpergewicht</i>	<i>Dosierung</i>
2,5 kg	1 Tablette
5 kg	2 Tabletten
7,5 kg	3 Tabletten
10 kg	4 Tabletten

Im Falle von einer natürlichen Reinfektion mit parasitären Würmern ist die Behandlung zu wiederholen.

Eine präventive Routinebehandlung von erwachsenen Tieren ist im Falle von minimalen Infektionsdruck 2 bis 4 Mal im Jahr zu verabreichen.

Eine häufigere Routinebehandlung mit Intervallen von 6 bis 8 Wochen wird empfohlen für Hunde in Zwingeranlagen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Für Hunde: die Tabletten zerkleinert in das Futter verabreichen oder in Wasser aufgelöst und gemischt unter das Futter.

Für Katzen: die Tabletten in Wasser auflösen und unter das Futter mischen.

Die Verabreichung der Tabletten nur in Wasser aufgelöst wird nicht empfohlen.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nach dem "EXP.:" nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Die Hände waschen nach dem Gebrauch.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Es sollte eine Zurückhaltung in der frühen Schwangerschaft über mögliche embryotoxische Effekte festgestellt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Die Verabreichung von Panacur ist vereinbar mit gleichzeitigen Impfungen und anderen Behandlungen mit Antibiotica.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

August 2016

15. WEITERE ANGABEN

Faltschachtel mit 10 Tabletten in Blisterverpackung.

Faltschachtel mit 20 Tabletten in Blisterverpackung.

Faltschachtel mit 50 Tabletten in Blisterverpackung.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Zulassungsnummer: BE-V143981

Weise der Aushändigung: Freie Abgabe.