

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Aspirine C 400 mg / 240 mg comprimés effervescents acide acétylsalicylique, acide ascorbique

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3-5 jours.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'Aspirine C et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aspirine C?
3. Comment prendre Aspirine C?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Aspirine C?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QU'ASPIRINE C ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Aspirine C est un médicament antalgique, antipyrétique et anti-inflammatoire. Ce médicament est utilisé pour:

- Fièvre et douleurs en cas de grippe ou d'autres infections
- Maux de tête
- Maux de dents, sauf avant ou après une intervention chirurgicale dentaire
- Névralgie
- Lumbago
- Douleurs musculaires
- Douleurs menstruelles

Le traitement soulage la douleur et abaisse la fièvre, mais n'a pas d'effet sur l'origine du mal.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3-5 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ASPIRINE C?

N'utilisez jamais Aspirine C

N'utilisez pas Aspirine C :

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- en cas d'ulcères au niveau de l'estomac et du duodénum (ulcères duodénaux) ou si vous avez déjà souffert de ces affections.

- en cas de risque de saignements.
- si vous prenez simultanément des anticoagulants (par ex. dérivés de la coumarine, héparine).
- en cas d'asthme ou d'hypersensibilité (allergie) connue aux salicylés, aux anti-inflammatoires non - stéroïdiens et à la tartrazine (un colorant).
- en cas de réduction sévère du graves du fonctionnement des reins.
- Pendant les 3 derniers mois de la grossesse.
- En cas de réduction sévère du fonctionnement du foie, surtout en cas d'utilisation prolongée de grandes quantités.
- si vous utilisez aussi simultanément du méthotrexate (souvent utilisé pour traiter le cancer) (aux doses de méthotrexate égales ou supérieures à 15 mg par semaine).
- en cas de problèmes cardiaques graves.
- Lorsque vous suivez un régime pauvre en sel strict.

Si vous n'êtes pas certain que l'un de ces points s'applique à votre cas, contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser Aspirine C.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament:

- si vous souffrez d'affections allergiques (par ex.: rhume des foins, multiples polypes dans le nez, urticaire, réactions cutanées, démangeaisons) ou d'infections chroniques des voies respiratoires, ou si vous présentez une hypersensibilité aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Vous courez alors le risque de développer des crises d'asthme. Si vous avez une crise d'asthme, il y a lieu d'interrompre le traitement et de consulter votre médecin. L'hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens est une indication absolue pour ne pas utiliser l'acide acétylsalicylique.
- si vous avez déjà eu des ulcères au niveau de l'estomac ou de l'intestin, ou des hémorragies au niveau de l'estomac ou de l'intestin, ou si vous souffrez en ce moment de troubles digestifs. Même si vous n'avez pas eu de tels problèmes de saignements dans le passé, vous devez être prudent(e). Dans tous les cas, arrêtez le traitement si vous présentez une hémorragie au niveau de l'estomac ou de l'intestin.
- en cas de problèmes au niveau des reins ou du foie, de goutte (une affection rhumatismale), de déshydratation, d'hypertension non maîtrisée, déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (une enzyme spécifique), de diabète et de prise de diurétiques.
- chez les patients qui souffrent de problèmes rénaux ou circulatoires. En effet, Aspirine C peut augmenter le risque de problèmes rénaux.
- en cas d'utilisation prolongée de doses quotidiennes élevées. L'utilisation prolongée de doses quotidiennes élevées est déconseillée, car cela pourrait induire des problèmes au niveau des reins.
- en cas de salicylisme (voir description dans la rubrique « Quels sont les effets indésirables éventuels? ») : la sensibilité diffère fortement d'une personne à l'autre. Les personnes âgées y sont plus sensibles que les adultes jeunes.
- si vous présentez habituellement des règles abondantes ou des saignements en dehors de la période des règles. Il existe en effet un risque de règles excessives et prolongées.
- si vous portez un stérilet (une forme de contraception) (voir rubrique « Autres médicaments et Aspirine C »)
- si vous tombez enceinte pendant le traitement. Dans ce cas, vous devez consulter immédiatement un médecin. L'utilisation d'Aspirine C est déconseillée pendant les 3 derniers mois de la grossesse.
- pendant et après des interventions chirurgicales (y compris les petites interventions, p. ex. extraction dentaire). Si vous utilisez Aspirine C et que vous deviez subir une intervention chirurgicale ou dentaire, il est préférable de consulter votre médecin.
- Peu avant ou peu après la prise d'alcool: vous ne pouvez alors pas prendre d'acide acétylsalicylique.

- les patients vaccinés contre la varicelle doivent éviter la prise de ce médicament pendant les 6 semaines suivant la vaccination. Cela pourrait notamment induire le syndrome de Reye, une affection très rare, mais parfois fatale (voir également rubrique 4 «Quels sont les effets indésirables éventuels »).
- L'utilisation d'Aspirine C pourrait diminuer la fertilité. Cet effet est réversible à l'arrêt du traitement. Toutefois, aucun cas de diminution de la fertilité n'a été signalé à ce jour lors de la prise d'Aspirine C (voir rubrique « Fertilité, grossesse et allaitement »).
- Lorsque vous suivez un régime pauvre en sel ou sans sel, vous devez tenir compte de la teneur en sodium de chaque comprimé effervescent (467 mg). Le cas échéant, demandez conseil à votre médecin.
- Aspirine C peut interférer avec des analyses de laboratoire. Par conséquent, si des analyses sont prévues, vous devez informer votre médecin que vous prenez ce médicament.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si l'une des mises en garde ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

L'utilisation de ce médicament chez les enfants de moins de 12 ans présentant de la fièvre, n'est pas recommandé sans avis médical.

Chez les enfants de moins de 12 ans présentant une fièvre supposée d'origine virale, le médecin ne prescrira des médicaments à base d'acide acétylsalicylique que lorsque d'autres médicaments auront donné un résultat insuffisant. Si un enfant présentant de la fièvre souffre de troubles de la conscience ou doit vomir beaucoup après la prise du médicament, l'utilisation du médicament doit être immédiatement arrêtée. Il faut alors aussitôt consulter un médecin. Il pourrait en effet s'agir du syndrome de Reye, une affection très rare, mais parfois mortelle, qui doit être traitée directement. On n'a toutefois pas encore démontré avec certitude que les médicaments à base d'acide acétylsalicylique peuvent provoquer cette maladie.

Autres médicaments et Aspirine C

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

L'effet du traitement par Aspirine C peut se modifier en cas de prise simultanée avec d'autres médicaments utilisés pour traiter les affections suivantes :

- cancer ou polyarthrite rhumatoïde (méthotrexate)
- formation de caillots sanguins (p. ex. warfarine (dérivés coumariniques), héparine, ticlopidine, pentoxifylline)
- goutte (probenécid, benzbromarone (agents uricosuriques))
- hypertension (p. ex. diurétiques et IECA)
- douleur et inflammation (p. ex. médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les pyrazolones, les corticoïdes)
- tristesse, états dépressifs, troubles de l'humeur (p. ex. lithium, ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine))
- problèmes cardiaques (p. ex. digoxine)
- insomnie, anxiété (p. ex. barbituriques)
- diabète (p. ex. insuline, sulfamides hypoglycémiants)
- épilepsie (p. ex. acide valproïque)
- infections (sulfamides (une certaine classe d'antibiotiques))
- un excès d'acide gastrique (composés à base de magnésium, d'aluminium et de calcium)
- certaines affections du système immunitaire (interféron alpha)
- grossesse : si vous portez un stérilet (une forme de contraceptif)

- inflammation, douleur et fièvre : ibuprofène. L'utilisation simultanée peut modifier l'effet de l'acide acétylsalicylique sur l'agrégation plaquettaire.
- accumulation de fer ou d'aluminium (p. ex. déféroxamine (administrée principalement en milieu hospitalier))
- L'acide ascorbique (= vitamine C) peut influencer le dosage du glucose dans l'urine ou le sang. Par conséquent, la prise de vitamine C doit être interrompue quelques jours avant la réalisation d'un dosage du glucose.

Si vous êtes déjà traité avec l'un des médicaments mentionnés ci-dessus, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser de l'acide acétylsalicylique.

Aspirine C avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Évitez la consommation d'alcool lorsque vous prenez Aspirine. L'alcool accroît la toxicité de l'acide acétylsalicylique sur l'estomac.

Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

N'utilisez ce médicament pendant la grossesse que sur avis du médecin.

Ne l'utilisez pas pendant les 3 derniers mois de la grossesse.

Les femmes qui tombent enceintes pendant le traitement doivent consulter immédiatement un médecin.

Évitez l'utilisation régulière et/ou la prise de doses élevées de ce médicament lorsque vous allaitez, car il se retrouve dans le lait maternel.

Les femmes ayant un désir de grossesse sont invitées à consulter leur médecin avant d'utiliser ce médicament (voir rubrique « Avertissements et précautions »).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Aspirine C contient du sodium

Aspirine C contient 467 mg de sodium par comprimé.

La prudence est de rigueur chez les patients suivant un régime limitant l'apport en sodium.

3. COMMENT PRENDRE ASPIRINE C?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Veuillez-vous adresser à votre médecin si le traitement aggrave vos symptômes de douleur et/ou de fièvre ou si ces symptômes ne s'améliorent pas après 3 à 5 jours.
- Sauf indication contraire de votre médecin, ne prenez pas plus d'Aspirine C que la quantité indiquée ci-dessous.
- En principe, ce traitement doit être aussi bref que possible. Un traitement de longue durée ne sera entrepris qu'après avis du médecin.
- Ne prenez pas Aspirine C plus de 3 à 5 jours sans avis médical.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 12 ans :

Prenez 1 à 2 comprimés effervescents d'Aspirine C par prise, à répéter toutes les 4-8 heures.

Maximum 10 comprimés effervescents par jour (24 h).

Patients âgés

Les patients âgés prendront 1 à 2 comprimés effervescents d'Aspirine C par prise, à répéter toutes les 4-8 heures.

Les patients âgés peuvent utiliser maximum 5 comprimés effervescents d'Aspirine C par jour.

Utilisation chez les enfants

Chez les enfants âgés de moins de 12 ans présentant une fièvre probablement causée par un virus, le médecin ne prescrira des médicaments à base d'acide acétylsalicylique que si d'autres médicaments ont fourni un résultat insuffisant. En effet, dans de rares cas, le syndrome de Reye peut survenir lorsqu'on administre l'acide acétylsalicylique (voir rubrique « Avertissements et précautions »).

Mode d'administration

Ce médicament doit se prendre par voie orale.

Dissoudre les comprimés effervescents dans un verre d'eau et boire la solution.

Si vous avez pris plus d'Aspirine C que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Aspirine C, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245). Si possible, apportez l'emballage avec vous lorsque vous demanderez conseil.

Signes qui peuvent indiquer un surdosage: étourdissements, bourdonnement d'oreille, surdit , transpiration excessive, naus es, vomissements, maux de t te, confusion, saignement gastro-intestinal, faible taux de sucre dans le sang (hypoglyc mie), difficult s respiratoires, hyperventilation (respiration excessivement profonde), forte fi vre,  touffement, troubles du rythme cardiaque, d shydratation, diminution de la production d'urine, probl mes r naux, coma, crises d' pilepsie, caillots dans les vaisseaux sanguins.

Une hospitalisation est n cessaire lors de la prise de trop grandes quantit s. Les enfants sont plus sensibles au surdosage que les adultes. Chez les enfants, une intoxication aigu  (empoisonnement) peut survenir d s la prise d'une dose de 100 mg d'acide ac tylsalicylique/kg de poids corporel.

Si vous oubliez de prendre Aspirine C

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubli  de prendre.

Si vous arr tez de prendre Aspirine C

  n'utiliser qu'en cas de plaintes : la prise de ce m dicament peut  tre arr t e d s que la plainte a disparu.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce m dicament, demandez plus d'informations   votre m decin ou   votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS IND SIRABLES  VENTUELS ?

Comme tous les m dicaments, ce m dicament peut provoquer des effets ind sirables, mais ils ne surviennent pas syst matiquement chez tout le monde.

Aper u des effets ind sirables possibles :

Fr quence ind termin e (la fr quence ne peut  tre estim e sur la base des donn es disponibles) :

Probl mes gastro-intestinaux (troubles gastro-intestinaux) :

- nausées
- diarrhée (l'administration de doses élevées de vitamine C peut induire une diarrhée)
- vomissements
- douleurs gastro-intestinales
- inflammation gastro-intestinale
- ulcères gastro-intestinaux
- saignements au niveau du système gastro-intestinal, se traduisant par des symptômes tels que, notamment, une perte de sang au niveau du tube digestif

Arrêtez immédiatement la prise de ce médicament en cas de saignement du tractus gastro-intestinal.

Affections vasculaires (saignements) :

En raison de son effet sur l'agrégation plaquettaire, l'acide acétylsalicylique peut induire un risque accru de saignements :

- saignements après une opération
- ecchymoses (bleus)
- saignement de nez
- saignements urogénitaux
- saignements des gencives
- hémorragies très sévères (rares à très rares), telles qu'une hémorragie gastro-intestinale ou une hémorragie cérébrale

Affections hématologiques et du système lymphatique :

- les pertes de sang peuvent entraîner une anémie/une carence en fer
- anémie chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (une enzyme)
- dans certains cas isolés, une diminution du nombre de plaquettes a été observée

Affections du rein et des voies urinaires (symptômes rénaux) :

- troubles des reins
- insuffisance rénale aiguë
- goutte : l'élimination d'acide urique est influencée par les salicylés. Cette donnée est notamment importante pour les patients souffrant de goutte.

Affections du système immunitaire (réaction allergique), se traduisant par des symptômes tels que, notamment :

- syndrome asthmatique
- crises de détresse respiratoire
- réactions cutanées (éruption cutanée, urticaire et démangeaisons)
- inflammation de la muqueuse nasale
- problèmes respiratoires
- plaintes gastro-intestinales
- problèmes cardiaques
- accumulation d'eau
- choc allergique (très rare)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :

- Dans certains cas isolés, des réactions cutanées graves ont été signalées.

Troubles du métabolisme et de la nutrition :

- Dans certains cas isolés, une diminution des taux de sucre dans le sang a été observée.

Affections hépatobiliaires :

- Dans certains cas isolés, une augmentation des enzymes du foie a été observée.

Affections de l'oreille et du labyrinthe :

- **Bourdonnement d'oreille (acouphène).** Il peut s'agir du premier signe de salicylisme (une intoxication causée par l'utilisation de préparation de salicylés, en cas de prise de doses trop élevées pendant une période prolongée). D'autres symptômes du salicylisme incluent :
 - troubles de l'audition
 - fatigue
 - étourdissements
 - soif
 - respiration excessivement profonde
 - vomissements

La sensibilité au salicylisme diffère fortement d'une personne à l'autre. Les personnes âgées sont plus sensibles que les adultes jeunes.

Consultez votre médecin si vous présentez un bourdonnement d'oreille : il est possible qu'il interrompe votre traitement, éventuellement de façon temporaire.

Effets indésirables supplémentaires chez les enfants

Chez les enfants âgés de moins de 12 ans présentant une fièvre probablement causée par un virus, qui sont traités par acide acétylsalicylique, le syndrome de Reye peut rarement survenir. Il s'agit d'une maladie très rare, mais parfois fatale, qui se caractérise par :

- des troubles de la conscience
- de forts vomissements après la prise du médicament

Il est nécessaire d'interrompre le traitement si ces effets indésirables surviennent.

Consultez immédiatement un médecin si les effets indésirables mentionnés ci-dessus surviennent après la prise de ce médicament chez un enfant présentant une fièvre. Le syndrome de Reye exige un traitement immédiat.

Néanmoins, il n'est pas encore établi avec certitude que les médicaments à base d'acide acétylsalicylique puissent provoquer cette maladie.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail : patientinfo@fagg-afmps.be

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ASPIRINE C ?

Conserver à température ambiante (15 - 25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Aspirine C

- Les substances actives sont: acide acétylsalicylique 400 mg et acide ascorbique 240 mg.
- Les autres composants (excipients) sont: monocitrate de sodium, bicarbonate de sodium, acide citrique, carbonate de sodium.

Pour les remarques relatives au sodium, consultez la rubrique 2.

Aspect d'Aspirine C et contenu de l'emballage extérieur

Boîte de 20 comprimés effervescents emballés dans un film thermosoudé en aluminium.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

BAYER SA - NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen)

Tél. : 02 / 535 63 11

Fabricant

Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Allemagne

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

BE040844

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2018