

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Livostin 0,5 mg/ml collyre, suspension

lévocabastine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser Livostin avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Livostin et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Livostin
3. Comment utiliser Livostin
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Livostin
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LIVOSTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Livostin est un médicament contre les troubles oculaires allergiques.

Livostin collyre est indiqué pour un soulagement rapide et de longue durée d'inflammations des yeux dues à une hypersensibilité, comme en cas de rhume des foins. Celles-ci peuvent se manifester tant pendant certaines saisons que pendant toute l'année.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LIVOSTIN**N'utilisez jamais Livostin**

- Si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament. Ces composants sont mentionnés sous le point 6. En cas de doute, consultez d'abord votre médecin ou votre pharmacien.

Faites attention avec Livostin

- Livostin ne peut être utilisé que pour les inflammations des yeux dues à une allergie (hypersensibilité) et non pour d'autres inflammations oculaires ou affections.

- Si vous êtes atteint(e) d'une affection rénale, vous ne pouvez pas utiliser Livostin collyre pendant une période prolongée. En effet, le médicament est éliminé principalement par les reins.
- Si vous portez des lentilles de contact souples, vous devez les ôter lorsque vous appliquez Livostin collyre dans vos yeux.

Les mesures suivantes sont utiles, après administration du collyre, pour diminuer la résorption dans la circulation sanguine :

- maintenir la paupière fermée pendant 2 minutes ;
- presser le canal lacrymal avec le doigt pendant 2 minutes.

Utilisation d'autres médicaments

Les données disponibles sont encore insuffisantes concernant les interactions possibles avec d'autres médicaments à appliquer dans les yeux. Il vaut donc mieux ne pas utiliser ce médicament en même temps que d'autres médicaments de ce genre.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Rien de particulier.

Grossesse et allaitement

Si vous planifiez une grossesse, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Aucune donnée n'est encore connue sur l'influence de ce produit pendant la grossesse chez la femme. Votre médecin ou pharmacien décidera si vous pouvez utiliser le collyre pendant votre grossesse.

Vous ne pouvez pas utiliser Livostin collyre pendant la période où vous allaitez sans en parler d'abord à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Livostin collyre n'entraîne aucune somnolence et ne diminue ni la capacité ni la vitesse de réaction. Le collyre peut être utilisé par les conducteurs de véhicule ou par les personnes qui utilisent des machines.

Informations importantes concernant certains composants de Livostin

Livostin collyre contient du chlorure de benzalkonium et du propylène glycol. Évitez le contact avec des lentilles souples car cela pourrait provoquer une irritation oculaire. Les lentilles de contact doivent être ôtées avant l'administration du collyre et l'on attendra au moins 15 minutes avant de les remettre. Le médicament peut faire décolorer les lentilles de contact souples.

3. COMMENT UTILISER LIVOSTIN

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin ou votre pharmacien. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes et enfants :

La posologie habituelle est de 1 goutte de Livostin par œil, 2 fois par jour.

Lorsque les symptômes sont graves, vous pouvez administrer 3 à 4 fois par jour 1 goutte par œil.

Retournez le flacon pour instiller chaque fois 1 goutte directement dans le coin externe de l'œil.

Avant chaque utilisation, il convient de bien agiter le flacon.

Vous ne pouvez pas utiliser le collyre plus de 1 mois après la première ouverture du flacon. Pour des raisons d'hygiène, vous éviterez tout contact du flacon avec les yeux.

Si vous avez utilisé plus de Livostin que vous n'auriez dû ?

L'application d'une trop grande quantité de Livostin collyre dans les yeux n'entraîne aucun symptôme d'empoisonnement.

Si vous avalez par hasard le contenu du flacon, il se peut que vous vous sentiez somnolent(e). Dans ce cas, vous devez boire beaucoup de boissons non alcoolisées, de sorte que le médicament puisse être évacué plus rapidement par les reins.

Si une trop grande quantité de Livostin a été administrée ou si le produit a été avalé, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070.245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Livostin

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Livostin

Rien de particulier.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Livostin peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants liés à l'utilisation de Livostin collyre peuvent être graves : gonflement de l'œil, gonflement de la paupière, hématome oculaire, une forme spéciale de réaction allergique caractérisée par un gonflement des lèvres, de la langue et des paupières, urticaire et essoufflement (œdème angioneurotique) et hypersensibilité. Si vous

ressentez l'un de ces effets indésirables comme grave, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables très fréquents (signalé chez 1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :

- douleur oculaire
- vision trouble

Les effets indésirables très rares (signalé chez moins de 1 utilisateur sur 10 000) sont :

- céphalée

Effets dont la fréquence est indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles) :

- conjonctivite, inflammation des paupières, larmoiement des yeux
- irritation de la peau qui est entrée en contact avec le médicament, urticaire
- réaction au niveau du site d'application comme brûlure, rougeur, irritation, douleur, gonflement, prurit dans les yeux et vision trouble

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LIVOSTIN

Conserver Livostin collyre à température ambiante (15-25 °C). Veillez à bien fermer le flacon après chaque utilisation afin d'éviter toute contamination.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Livostin après la date de péremption mentionnée sur la boîte après les lettres EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Livostin

- La substance active de Livostin est le chlorhydrate de lévocabastine. Chaque ml contient 0,5 mg de lévocabastine. 1 ml de collyre équivaut à 33 gouttes, chaque goutte contenant 0,015 mg de lévocabastine.
- Les autres composants de Livostin sont : 0,295 mg/ml de chlorure de benzalkonium solution à 50 % comme agent conservateur, propylène glycol, polysorbate 80,

monohydrogénophosphate disodique anhydre, dihydrogénophosphate de sodium monohydraté, édétate disodique, hypromellose 2910 3000mPa.s, eau pour injection.

Aspect de Livostin et contenu de l'emballage extérieur

Flacon compte-gouttes de 4 ml de collyre, suspension.

Mode de délivrance

Belgique : Livostin collyre n'est pas soumis à la prescription médicale.

Luxembourg : Livostin collyre est soumis à la prescription médicale.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Johnson & Johnson Consumer SA

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Fabricant

Famar S.A

Agiou Dimitriou 63

Alimos Attiki

17456

Grèce

Et

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B- 2340 Beerse

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE 154533

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 05/2016