
NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR**IMONOGAS 240 mg capsules molles**

Siméthicone

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser IMONOGAS avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours, consultez un médecin.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'IMONOGAS et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser IMONOGAS
3. Comment utiliser IMONOGAS
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver IMONOGAS
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QU'IMONOGAS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Contre la sensation de ballonnement (flatulence).

IMONOGAS agit en décomposant le gaz emprisonné qui provoque le ballonnement. IMONOGAS est un médicament destiné au traitement symptomatique des gaz qui s'accumulent dans l'estomac (flatulences) et qui provoquent une sensation de ballonnement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER IMONOGAS**N'utilisez jamais IMONOGAS**

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la siméthicone ou à l'un des autres composants contenus dans la capsule (voir rubrique 6).

Faites attention avec IMONOGAS

Consultez votre médecin si :

- votre problème de gaz ne s'améliore pas après 10 jours de traitement ;
- vous êtes constipé(e) et cela ne s'améliore pas.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Cependant, comme la siméthicone n'est pas absorbée par le tube digestif l'exposition systémique est négligeable et IMONOGAS peut être utilisé chez les femmes enceintes et allaitantes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

IMONOGAS n'a pas d'effet connu sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants d'IMONOGAS

Non applicable.

3. COMMENT UTILISER IMONOGAS**Dose habituelle :**

Si vous avez 15 ans ou plus : Prenez une capsule à la fin de chaque repas principal. Avalez la capsule avec un grand verre d'eau. Ne prenez pas plus de 3 capsules molles par jour. Ne prenez pas ce médicament pendant plus de 10 jours. Ne pas donner IMONOGAS aux enfants de moins de 15 ans.

Si vous avez utilisé plus d'IMONOGAS que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop d'IMONOGAS, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser IMONOGAS

Prenez une capsule après le prochain repas principal. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, IMONOGAS peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés à une fréquence "inconnue"

- Douleur abdominale, nausée, vomissement et constipation ;
- Réactions allergiques, telles qu'éruption de la peau, démangeaisons, œdème du visage ; les lèvres, la gorge et de la langue et difficulté respiratoire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; patientinfo@fagg-afmps.be) ou la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (<http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER IMONOGAS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser IMONOGAS après la date de péremption mentionnée sur la plaquette thermoformée et sur la boîte après « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient IMONOGAS

- La substance active est la siméthicone. Chaque capsule contient 240 mg de siméthicone.
- Les autres composants sont la gélatine et le glycérol.

Qu'est ce qu'IMONOGAS et contenu de l'emballage extérieur

IMONOGAS est une capsule molle transparente en gélatine. Chaque emballage contient 10, 20 ou 30 capsules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse

Fabricant :

Catalent France Beinheim SA, 74 rue Principale, 67930 Beinheim, France

Numéro d'autorisation sur le marché

BE 291383

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Danemark: IMOGAS

Suède: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel

Norvège: IMOGAS kapsel, 240 mg

Irlande: IMOGAS 240 mg soft capsule

Belgique: IMONOGAS

Luxembourg: IMONOGAS

Islande: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki

Espagne: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas

Portugal: IMOGAS 240 mg, cápsulas moles

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2014.

Conseil d'éducation à la santé

Que faire en cas de difficulté de digestion?

Les digestions difficiles :

Ces troubles surviennent souvent en cas d'alimentation :

- trop abondante ou trop riche ;
- prise trop rapidement, sans mâcher ;
- accompagnée de boissons alcoolisées en quantités trop importantes.

Essayez d'éviter ces facteurs déclenchant.

Le ballonnement – les flatulences:

Certains aliments favorisent l'apparition de ballonnements :

- les aliments contenant de l'air (boissons gazeuses, pain frais) ;
- les aliments riches en hydrates de carbone non absorbables (légumes secs, choux, crudités, oignons).

Essayez d'éviter ces aliments.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin si vous avez besoin de plus de conseils.