

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

VIRATOP 5% crème
Aciclovir

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmière.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien, ou à votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ce Viratop 5% crème et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Viratop 5% crème ?
3. Comment utiliser Viratop 5% crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Viratop 5% crème ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE VIRATOP 5% CREME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Viratop 5% crème est une crème dermique à appliquer sur les lèvres et autour des lèvres (usage externe).

Viratop 5% crème contient de l'aciclovir, un médicament contre le virus de l'herpès.

Viratop 5% crème est indiqué dans le traitement des boutons de fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VIRATOP 5% CREME ?

N'utilisez jamais Viratop 5% crème :

- si vous êtes allergique à l'aciclovir, au valaciclovir, au propylène glycol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, ou à votre pharmacien ou à votre infirmière avant d'utiliser Viratop 5% crème.

- Le premier diagnostic de boutons de fièvre sera de préférence posé par un médecin.
- Éviter tout contact de la crème avec les muqueuses, comme l'intérieur de la bouche, des yeux ou du vagin, car elle peut être irritante. Il convient de faire particulièrement attention à éviter l'introduction accidentelle de crème dans les yeux.
- Des picotements sont possibles, mais ils sont passagers.
- N'utilisez pas Viratop 5% crème pour le traitement d'herpès génital.
- Consultez votre pharmacien ou votre médecin en cas d'évolution anormale des lésions pendant l'utilisation de la crème ; cela pourrait indiquer par exemple une infection bactérienne concomitante.

- Si vous êtes sévèrement immunodéprimé (par exemple si vous êtes atteint du SIDA ou si vous avez subi une transplantation de moelle osseuse). Consultez un médecin pour le traitement de toute infection.

Autres médicaments et Viratop 5% crème

On n'a identifié aucune interaction cliniquement significative.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Viratop 5% crème avec des aliments et des boissons et de l'alcool

Pas de particularités.

Grossesse et allaitement et fécondité

L'utilisation de Viratop 5% crème sur les boutons de fièvre n'est pas contre-indiquée en cours de grossesse et allaitement. Il va de soi que la prudence reste de rigueur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Viratop 5% crème n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Viratop 5% crème contient

La crème contient du propylène glycol comme excipient. Le propylène glycol peut provoquer une irritation cutanée.

3. COMMENT UTILISER VIRATOP 5% CREME

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, ou pharmacien ou infirmière. Vérifiez auprès de votre médecin, ou pharmacien ou infirmière en cas de doute.

La dose recommandée est :

Adultes et enfants :

- Viratop 5% crème doit être appliqué 5 fois par jour à intervalles de 4 heures sur les lésions installées ou en cours de formation.
- Le traitement doit être poursuivi pendant au moins 5 jours consécutifs, même si les lésions ne se développent pas complètement.
- En cas de guérison incomplète, le traitement peut encore être poursuivi pendant 5 jours supplémentaires.
- Si les boutons de fièvre sont toujours présents après 10 jours de traitement, il vous est recommandé de consulter votre médecin.
- Viratop 5% crème doit être appliqué dans les plus brefs délais après le début de l'infection, sur les lésions installées ou en cours de formation.
- Une infection récidivante est souvent précédée d'une courte période durant laquelle les zones atteints sont douloureuses ou engourdis; elles sont brûlantes ou démangent. Toute personne ayant déjà présenté des boutons de fièvre reconnaît ces signes et peut par conséquent anticiper la poussée. Le traitement doit débiter de préférence à ce stade ou immédiatement après l'apparition des premiers boutons.

Mode d'emploi du tube : percer la protection en aluminium au moyen du dispositif spécialement prévu à cet effet sur le bouchon. Pousser sur le bas du tube pour faire sortir la crème. Refermer soigneusement après usage.

Si vous avez utilisé plus de Viratop 5% crème que vous n'auriez dû

Aucune donnée n'est disponible en ce qui concerne l'utilisation de quantités excessives. On n'attend pas d'effets indésirables si le contenu entier d'un tube de 3 g qui contient 150 mg d'aciclovir était ingéré oralement.

Si vous avez utilisé trop de Viratop 5% crème, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245-245).

Si vous oubliez d'utiliser Viratop 5% crème

Aussitôt que vous constatez que vous avez oublié d'utiliser Viratop 5% crème, veuillez appliquer Viratop 5% crème et continuer avec le traitement comme précisé dans la section « Comment utiliser Viratop 5% crème ».

Si vous arrêtez d'utiliser Viratop 5% crème

Pas de précautions particulières.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Viratop 5% crème, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien ou à votre infirmière.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants sont rapportés :

En cas d'apparition de ces phénomènes il y a lieu d'interrompre le traitement :

- réactions d'hypersensibilité immédiate, notamment un angio-œdème et de l'urticaire.
- réactions allergiques de la peau (dermatite de contact)

Peu fréquent (affectent maximum 1 utilisateur sur 100)

- une sensation passagère de brûlure ou de picotement après l'application de la crème.
- un léger dessèchement ou une desquamation de la peau.
- démangeaisons

Rare (affectent maximum 1 utilisateur sur 1.000)

- rougeur (érythème).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien ou à votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VIRATOP 5% CREME

Conserver à température ambiante.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et sur le tube après l'abréviation EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Viratop 5% crème

- La substance active est l'aciclovir.
- Les autres composants sont : propylène glycol, téfose, labrafil, huile minérale, poloxamère 407, laurylsulfate de sodium et eau purifiée.

Aspect de Viratop 5% crème et contenu de l'emballage extérieur

Viratop 5% crème est disponible sous la forme d'un tube aluminium de 2 g ou 3 g de crème.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Pays-Bas

Fabricant

Laboratorio Farmaceutico C.T.
Via D. Alighieri 71

Viratop crème 5 %_PIL_FR_07/2018

18038 Sanremo (IM)
Italie

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché
BE199455

Mode de délivrance
Médicament délivré sans prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2018.