

**B. NOTICE**

**NOTICE**

Flubenol KH, 44 mg, pâte orale

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Eli Lilly Benelux NV  
Division Elanco Animal Health  
Markiesstraat 1  
B-1000 Bruxelles  
Belgique

Fabricant responsable de la libération des lots:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B  
Queluz de Baixo  
2730-055 Barcarena  
Portugal

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Flubenol KH, 44 mg, pâte orale.  
Flubendazole.

**3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS****Par ml:**

**Substance active:** 44 mg de flubendazole

**4. INDICATION(S)**

1. Les infestations vermineuses chez le chien par:

- Ascarides: *Toxocara canis (stades adultes)*  
*Toxascaris leonina (stades adultes)*
- Tricocéphales: *Trichuris vulpis (stades adultes)*
- Ankylostomes: *Uncinaria stenocephala (stades adultes)*  
*Ancylostoma caninum (stades adultes)*

2. Les infestations vermineuses chez le chat par:

- Ascarides: *Toxocara cati (stades adultes)*  
*Toxascaris leonina (stades adultes)*
- Ankylostomes: *Ancylostoma tubaeforme (stades adultes)*
- Cestodes: *Taenia taeniaeformis (stades adultes)*

## 5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des vomissements occasionnels et transitoires et une diarrhée modérée ont été observés. Chez le chat, Flubenol KH pâte peut parfois provoquer une salivation. Ce phénomène est de courte durée et n'exerce aucune influence sur le déparasitage ou sur la santé générale du chat.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens et chats.


## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

1 ml par 2 kg de poids corporel = 22 mg/kg.

1. Chiens et chats infestés par des ascarides et des ankylostomes: 1 ml de pâte par 2 kg de poids corporel, une fois par jour, à administrer pendant 2 jours consécutifs.
2. Chiens et chats infestés par d'autres espèces de vers: 1 ml de pâte par 2 kg de poids corporel, une fois par jour, à administrer pendant 3 jours consécutifs.

Enlever le capuchon de sécurité (3). Tenir le piston (1) tout en bloquant la bague de réglage (2) sur la subdivision correspondant au poids corporel de l'animal en kilos. Administrer la pâte.

Pour une administration suivante, additionner le poids corporel de l'animal au nombre correspondant à la subdivision utilisée précédemment et bloquer la bague (2) sur la subdivision correspondant au total obtenu.



Exemple: Pour un chat de 3 kg, la bague de réglage sera successivement placée sur 3 kg pour la première administration, 6 kg pour la deuxième administration et 9 kg pour la troisième administration.

Mode d'administration: La pâte peut être administrée d'une des manières suivantes :

- \*introduire directement la dose exacte dans la gueule du chien ou du chat;
- \*mélanger la dose exacte à la nourriture (ce mode d'administration est indiqué pour les animaux difficiles à manipuler ou agressifs).

La seringue contient suffisamment de pâte pour traiter un animal de 5 kg pendant 3 jours.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

La pâte peut être administrée d'une des manières suivantes:

\*introduire directement la dose exacte dans la gueule du chien ou du chat;

\*mélanger la dose exacte à la nourriture (ce mode d'administration est indiqué pour les animaux difficiles à manipuler ou agressifs).

La seringue contient suffisamment de pâte pour traiter un animal de 5 kg pendant 3 jours.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Pas d'application.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 5 jours

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

## 12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

### **Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :**

La résistance de parasites vis-à-vis d'une classe définie d'anthelminthiques, peut se développer suite à l'utilisation fréquente et répétée d'anthelminthiques de cette classe.

### **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux**

Laver les mains après usage. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone atteinte avec de l'eau propre.

### **Gestation et lactation**

Flubenol KH peut être administré à des chiennes gravides ou qui allaitent.

### **Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)**

Des dosages atteignant 5 fois la dose recommandée n'ont pas entraîné d'effets indésirables.

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Octobre 2018

## 15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 et 50 x 7,8 ml ou 22,5 ml pâte dans une seringue en plastique, emballée dans une boîte en carton  
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V133052

Exempt de prescription.