

**NOTICE**

CATMINTH, pâte orale pour chats

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

CATMINTH, pâte orale pour chats

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Pyranteli embonas 115,2 mg (= pyrantelum 40 mg) - Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisable - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

**4. INDICATION(S)**

Le Catminth est destiné au traitement des verminoses gastro-intestinales du chat causées par les nématodes suivants :

Toxocara spp.

- *Toxocara cati*

Toxascaris spp.

- *Toxascaris leonina*

Ancylostoma spp.

- *Ancylostoma tubaeforme*- *Uncinaria stenocephala***5. CONTRE-INDICATIONS**

Aucune connue.

**6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun effet secondaire n'a été observé.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

**7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chats.

## **8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

La posologie est de 20 mg de pyrantel base par kg de poids vif (soit 0,25 g de pâte par demi kg de poids).

### **Posologie**

Chatons : traitement initial à l'âge de 2-3 semaines, puis à des intervalles de 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage, et puis tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois.

Chats adultes : 4 fois par an

Chattes allaitantes : en même temps que le premier traitement des chatons

### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Le Catminth s'administre en prise unique par voie orale.

Le Catminth est présenté en seringue (contenant 2 g ou 3 g de pâte) dont le corps est gradué en 0,25 g. Le volume de pâte compris entre 2 graduations convient au traitement de 0,5 kg de poids d'animal. Le contenu total de la seringue permet de traiter un chat de 4 kg respectivement 6 kg.

Pour assurer le bon dosage, le piston doit être mis à zéro avant le dosage. Avant l'administration, retirez le bouchon, appuyez doucement sur le piston jusqu'à ce que le joint atteigne la marque zéro et jetez toute pâte expulsée.

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

La quantité de pâte nécessaire au traitement peut être administrée :

- soit en introduisant directement l'injecteur délivrant le produit dans la gueule de l'animal,
- soit en mélangeant la pâte à une fraction de la ration quotidienne.

Il n'est pas nécessaire d'instaurer de précautions diététiques particulières avant ou après le traitement.

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

## **11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans

La seringue doit être conservée à l'abri de la lumière.

## **12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Aucune.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Comme pour toute substance anthelminthique, des souches résistantes peuvent apparaître chez les parasites cibles.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Il n'y a pas de mesures de sécurité particulière à prendre par les personnes administrant le produit.

Gestation et lactation :

Le Catminth peut être administré en toute sécurité aux femelles gestantes ou allaitantes.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Comme le pyrantel a le même mécanisme d'action que le levamisole, ces agents ne doivent pas être utilisés simultanément. Une interaction peut également se produire avec les organophosphorés et les carbamates qui ont un mécanisme d'action relaté. Le pyrantel ne doit pas être utilisé avec la pipérazine car les mécanismes d'action des deux substances sont antagonistes.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Le produit a une marge de sécurité large. Les études de surdosage n'ont montré aucun effet secondaire, ni chez les chatons, ni chez les chats adultes.

En cas surdosage, des signes de l'action cholinergique du pyrantel peuvent être observés.

Incompatibilités :

Aucune connue.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

10/2017

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Le Catminth est présenté en seringue contenant 2 g ou 3 g de pâte et dont le corps est gradué en 0,25 g. Les seringues sont présentées en emballage individuel.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées

BE-V115053

Délivrance libre.