

NOTICE
Panacur Comprimés 500 mg

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Pays-Bas
Représenté par MSD Animal Health SPRL, Clos du Lynx, 5, 1200 Bruxelles

Fabricant responsable de la libération des lots:

Intervet GesmbH, Siemensstraße 105, A-1210 Vienne, Autriche

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Panacur Comprimés 500 mg

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Substance active

fenbendazole. 500 mg/comprimé

4. INDICATION(S)

Infestation des chiens de taille moyenne et des grands chiens par des nématodes et cestodes gastro-intestinaux, tels que:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis

Taenia spp. o.a. *T. hydatigena*, *T. pisiformis*

Toxocara cati

Ancylostoma tubaeforme

Taenia taeniaformis

Aelurostrongylus

Ollulanus

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas, des troubles gastro-intestinaux (tels que des vomissements et une diarrhée modérée) peuvent apparaître chez le chien.

Dans de très rares cas, des réactions allergiques peuvent survenir chez le chien.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Pour chiens de taille moyenne ou de grande taille (plus de 15 kg).
Panacur Comprimés 250 mg sera administré aux jeunes et petits chiens.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale

Une dose de 50 mg de fenbendazole par kg de poids vif par jour.
Les animaux sont traités pendant 3 jours consécutifs.

Poids vif (kg)	Nombre de comprimés par jour
15	1 ½
20	2
25	2 ½
30	3
etc.	etc.

En cas de nouvelle contamination, le traitement doit être répété.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

:

- directement dans la gueule en plaçant le comprimé sur la base de la langue
- écrasés et mélangés dans la nourriture
- dissous dans un peu d'eau et mélangés à la nourriture.

10. TEMPS D'ATTENTE

Pas d'application.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 C

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'emballage après « EXP. : ». La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Se laver les mains après utilisation.

Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte :

Il faut observer une réticence au début de la gestation concernant des effets embryotoxiques potentiels.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

L'administration de Panacur est compatible avec des vaccinations et d'autres traitements simultanés, comme par exemple avec des antibiotiques.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Août 2016.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte de 10 comprimés en emballage blister.

Numéro d'enregistrement : BE-V176784

Mode de délivrance : vente libre