

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER

Flubenol KH, 44 mg, Pasta voor oraal gebruik

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Eli Lilly Benelux NV
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 BRUSSEL
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Flubenol KH, 44 mg, pasta voor oraal gebruik.
Flubendazole.

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E)> EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:

Werkzaam bestanddeel: 44 mg flubendazole

4. INDICATIE(S)

1. Worminfecties bij honden veroorzaakt door :

-Spoelwormen : *Toxocara canis* (volwassen stadia)
Toxascaris leonina (volwassen stadia)

-Zweepwormen: *Trichuris vulpis* (volwassen stadia)

-Haakwormen: *Uncinaria stenocephala* (volwassen stadia)
Ancylostoma caninum (volwassen stadia)

2. Worminfecties bij katten veroorzaakt door :

-Spoelwormen : *Toxocara cati* (volwassen stadia)
Toxascaris leonina (volwassen stadia)

-Haakwormen: *Ancylostoma tubaeforme* (volwassen stadia)

-Lintwormen: *Taenia taeniaeformis* (volwassen stadia)

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Occasioneel voorbijgaand braken en milde diarree werden waargenomen.

Bij katten kan Flubenol KH-pasta soms “speekselen” veroorzaken. Die salivatie is een kortstondig verschijnsel en heeft geen invloed op de therapeutische resultaten of op de algemene gezondheid van de katten.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Honden en katten.


8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

1 ml per 2 kg lichaamsgewicht = 22 mg/kg.

1. Honden en katten die met spoelwormen en haakwormen besmet zijn: 1 ml pasta per 2 kg lichaamsgewicht, éénmaal daags, gedurende 2 opeenvolgende dagen toedienen.
2. Honden en katten die met andere wormsoorten besmet zijn: 1 ml pasta per 2 kg lichaamsgewicht, éénmaal daags, gedurende 3 opeenvolgende dagen toedienen.

Neem de veiligheidsstop (3) weg. Houd de stamper (1) vast terwijl de verstelring (2) wordt vastgezet op de onderverdeling die overeenkomt met het lichaamsgewicht in kilogram van het dier. Dien de pasta toe.

Voor een volgende behandeling het lichaamsgewicht van het dier bijtellen bij het getal waarop de ring (2) de vorige keer werd gezet en de verstelring verplaatsen naar dit nieuwe getal.



Voorbeeld: Bij een kat van 3 kg wordt de verstelring achtereenvolgens op 3 kg geplaatst voor de eerste behandeling, op 6 kg voor de tweede behandeling en op 9 kg voor de derde behandeling.

Toedieningswijze: De pasta kan op één van de volgende manieren worden toegediend:

- *de exacte dosis rechtstreeks in de mond van de hond of kat spuiten;
- *de exacte dosis door het voeder mengen (deze toedieningswijze is aangewezen bij moeilijk te manipuleren en agressieve dieren);

De spuit bevat voldoende pasta om een dier van 5kg te behandelen gedurende 3 dagen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De pasta kan op één van de volgende manieren worden toegediend:

*de exacte dosis rechtstreeks in de mond van de hond of kat spuiten;

*de exacte dosis door het voeder mengen (deze toedieningswijze is aangewezen bij moeilijk te manipuleren en agressieve dieren);

De spuit bevat voldoende pasta om een dier van 5 kg te behandelen gedurende 3 dagen.

10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Niet bewaren boven 25°C.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 5 dagen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen bij frequent en herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum uit die klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Handen wassen na gebruik. In geval van accidenteel contact met de huid, moet de betrokken huidzone onmiddellijk met schoon water worden gewassen

Dracht en lactatie

Flubenol KH mag aan drachtige en lacterende dieren worden toegediend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Zelfs na het toedienen van 5 maal de aanbevolen dosis worden geen ongewenste effecten waargenomen.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Oktober 2018

15. OVERIGE INFORMATIE

1 en 50 x 7,8 ml of 22,5 ml pasta in een plastic spuit, verpakt in een kartonnen doosje.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

BE-V133052

Vrije aflevering.