

Bijsluiter

BIJSLUITER

BIJSLUITER: informatie voor de gebruiker

OSCILLOCOCCINUM®, globulen
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is OSCILLOCOCCINUM, globulen en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u OSCILLOCOCCINUM, globulen gebruikt ?
3. Hoe gebruikt u OSCILLOCOCCINUM, globulen ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u OSCILLOCOCCINUM, globulen ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is OSCILLOCOCCINUM, globulen en waarvoor wordt het gebruikt?

Homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel gebruikt wordt bij de behandeling van griepoestanden: rillingen, spierpijn, koorts, hoofdpijn.

OSCILLOCOCCINUM verkort de duur van de griepsymptomen. Tijdens de blootstellingsperiode aan griep kan een wekelijks gebruik de intensiteit van deze symptomen verminderen.

2. Wat u moet weten voordat u OSCILLOCOCCINUM, globulen gebruikt ?

Wanneer mag u OSCILLOCOCCINUM niet gebruiken ?

Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van OSCILLOCOCCINUM.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Informeer uw arts of apotheker wanneer u nog andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of wanneer de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

OSCILLOCOCCINUM heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

OSCILLOCOCCINUM bevat lactose en sacharose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bijsluiter

3. Hoe gebruikt u OSCILLOCOCCINUM, globulen ?

Oraal gebruik.

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals vermeld in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen:

De dosering varieert naargelang het moment waarop men begint:

- *tijdens de blootstellingsperiode aan griep*: 1 dosis per week.
- *beginnende griep*toestand: zo vroeg mogelijk 1 dosis, eventueel 2 tot 3 keer herhalen met een interval van 6 uur.
- *uitgebroken griep*toestand: 's ochtends en 's avonds 1 dosis gedurende 1 tot 3 dagen.

Het geneesmiddel moet ten minste 15 minuten vóór of 1 uur na de maaltijd worden ingenomen. Alle globulen van de dosis in de mond laten oplossen.

Gebruik bij kinderen jonger dan 1 jaar

De globulen moeten vooraf in water worden opgelost.

Heeft u te veel OSCILLOCOCCINUM gebruikt?

Wanneer u te veel van OSCILLOCOCCINUM heeft gebruikt of ingenomen, neem dan contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).

Bent u vergeten OSCILLOCOCCINUM te gebruiken ?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Tot op heden werden geen bijwerkingen gemeld.

Zoals elk geneesmiddel kan ook OSCILLOCOCCINUM bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Bijsluiter

5. Hoe bewaart u OSCILLOCOCCINUM, globulen ?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik OSCILLOCOCCINUM niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die te vinden is op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van deze maand.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen bevat OSCILLOCOCCINUM

- **De werkzame stof is**
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 0,01 ml
voor 1 dosis van 1g.
- **De andere stoffen zijn** sacharose en lactose.

Hoe ziet OSCILLOCOCCINUM eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dosis globulen in een buisje van polypropyleen met een dop van polyethyleen.

Doos van 3, 6 of 30 dosissen van 1 g. Niet alle verpakkingen kunnen gecommmercialiseerd zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Fabrikanten

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

BOIRON
20 rue de la Libération
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE457120

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 16/04/2014