

**B. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER**  
**AVICAS®**

- 1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend**  
Registratiehouder : Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze.  
Fabrikant: Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem
- 2. Benaming van het geneesmiddel**  
AVICAS®
- 3. Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)**  
Per tablet: Febantel 15 mg – Cellulos. microcristall. – Sod. Starch Glycoll. – Polysorb. – Polyvidon. – Silic. colloid. anhydr. – Magn. stear. – Lactose. q.s. ad 105 mg
- 4. Indicaties**  
Behandelen van worminfecties bij duiven, veroorzaakt door *Ascaridia columbae* (spoelworm) en *Capillaria* spp. (haarworm).
- 5. Contra-indicaties**  
Niet behandelen tijdens de rui, kort vóór en tijdens het koppelen en niet gebruiken bij duiven, die jongen azen.  
Niet toedienen aan duiven die bestemd zijn voor humane consumptie.
- 6. Bijwerkingen**  
Geen bijwerkingen bij therapeutische dosis.
- 7. Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is**  
Duiven, niet bestemd voor humane consumptie.
- 8. Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)**  
Dosering: 30 mg/kg. Dit komt overeen met 1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toe te dienen. Na 8 dagen herhalen.  
Bij zware *Capillaria*-besmetting: 2 opeenvolgende dagen behandelen en na 1 week opnieuw 2 dagen behandelen.
- 9. Aanwijzingen voor een juiste toediening**  
1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toedienen.
- 10. Wachtijd**  
AVICAS is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn. Consumptie van duiven behandeld met Avicas kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.
- 11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**  
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)
- 12. Speciale waarschuwingen**  
Alle duiven van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting.  
Na de behandeling het hok grondig reinigen om herbesmetting te voorkomen.  
Tot nog toe werd geen nadelig effect van febantel op de voortplanting bij duiven vastgesteld.  
Frequent en herhaaldelijk gebruik kan leiden tot de ontwikkeling van resistentie.  
Consumptie van duiven behandeld met Avicas kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

- 13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan**  
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in het milieu zouden terecht komen.
- 14. Datum waarop de bijsluiters voor het laatst herzien is**  
02/2012
- 15. Overige informatie**  
Voor diergeneeskundig gebruik  
Vrije aflevering  
  
BE-V168323